

NANO.T® Fe

Previne eficient cloroza ferică

NANO.T® FE permite un aport mai bun de fier datorită nanotehnologiei.

NANO.T® FE este recomandat pentru prevenirea clorozei ferice, acționând printr-o eliberare controlată a fierului.

NANO.T® FE este eficient și în soluri cu putere clorozantă ridicată, caracterizate printr-un conținut mare de calcar activ. Procesul de producție NANO.T® este un brevet al CEREA FCP.



Beneficii

- Previne eficient cloroza ferică, chiar și în terenuri cu putere clorozantă ridicată unde chelații sunt puțin eficienți (vezi 27);
- Favorizează o dezvoltare optimă a aparatului radicular;
- Persistent deoarece nu este dezactivat (eficient la pH 1-10) și nu este spălat din sol;
- Ușor de utilizat:
 - poate fi folosit în timpul zilei deoarece nu este fotolabil
 - nu creează depuneri în instalațiile de fertilizare poate fi aplicat atât în fertilizare cât și localizat
 - pH-ul acid crește eficacitatea fertilizanților asociați cu acesta

NANO.T

TIP
Lichid



AMBALAJ



COMPOZIȚIE

Fier (Fe) total	3%
din care solubil în apă	2,0%
din care sub formă nano	1,0%
Fosfor (P₂O₅) total	2,0%
Potasiu (K₂O) solubil în apă	2,5%
Sulf (SO₃) solubil în apă	3,0%
pH	1,3

DENSITATE

1,16 +/- 0,05 kg/dm³

CLOR SCĂZUT

Culoarea și densitatea sunt doar cu titlu informativ. Pentru avertismente de pericol, consultați secțiunea 154.

DOZAJ ȘI MOD DE UTILIZARE

CULTURA	DOZA FERTIRIGARE	PERIOADA
Baie radiculară	200 ml/hl	pre-transplantare
Drupacee	4-5 l/ha	reluare vegetativă, pre-înflorire, mărirea sămburilor, post-recoltare.
Actinidia (kiwi)	4-5 l/ha	reluare vegetativă, pre-înflorire, umflarea fructelor, post-recoltare.
Măr	4-5 l/ha	reluare vegetativă, pre-înflorire, umflarea fructelor, post-recoltare.
Păr	6-10 l/ha	deschiderea mugurilor, legarea fructelor, umflarea fructelor, post-recoltare.
Viță de vie	6-10 l/ha	reluare vegetativă, dezvoltare vegetativă, înflorire, legare a fructelor.
Citrice	30-60 ml/plantă	pre-înflorire, post-legare a fructelor, umflarea fructelor.
Legume în câmp deschis	3-4 l/ha	2-3 aplicări post-transplantare la fiecare 12-15 zile.
Roșii	5 l/ha	2-3 aplicări post-transplantare la fiecare 12-15 zile.
Legume de seră	300-500 ml/1000 m ²	2-3 aplicări post-transplantare la fiecare 12-15 zile.
Toate culturile	2-3 l/ha	APLICĂRI FOLIARE: în orice stadiu vegetativ